



7.2 Angiografie (shuntfoto)

Doelstelling:

Door middel van radiodiagnostiek het zichtbaar maken van de toegang tot de bloedbaan.

Algemene informatie/ toelichting

Een shuntfoto wordt gemaakt

- a. *enkele weken na de start van de dialysebehandeling (om vergelijkingsmateriaal te hebben)*
- b. *wanneer aan de hand van directe en indirecte parameters het vermoeden bestaat dat een shunt niet goed functioneert*
- c. *na trombectomie*

Algemeen

Stel de Röntgenafdeling van tevoren op de hoogte van de reden van de X shunt.

Indien er gerede kans bestaat dat na de shuntfoto een dotterprocedure moet volgen, dit doorgeven op de röntgen en dit als mogelijkheid op de aanvraag vermelden.

Informeer de patiënt: geef uitleg over wat er gaat gebeuren.

Check of de patiënt overgevoelig is voor contrastvloeistof en tref eventueel voorzorgsmaatregelen in overleg met de nefroloog.

Nazorg

Na het maken van de foto: uitwendige shunt: inpakken en beluisteren

inwendige shunt: naalden eruit halen en afdrukken (zie richtlijn 2.3)

Maak een eventueel afspraak in overleg met de patiënt.

Noteer de afspraak op het daarvoor bestemde formulier.

Complicaties

- Contrastovergevoeligheid
- Extravasaal

Verslaglegging

Noteer de relevante gegevens in het verpleegdossier